

Førstehjelpsutstyr: «Gaupe»

Ident	«Gaupe»
Status	Komplett
Sjekket	??


Naudsynt innhald

- Heftplaster
- Støttebind
- Steril kompress (4 stk.)
- Sårvask (våtserviett) (4 stk.)
- Enkeltmannspakke
- Gassbind (2stk)
- Saks
- Sportstape
- Plaster (fleire)

Ekstra innhald

- Munn-til-munn-maske
- Hansker
- Pinsett
- Paracet (4 tablettar)
- Solkrem
- Lidokainsalve (xylokain, brannsalve)

Kladd 19. mai. Vurder behov framover..



Ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonsmerter og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere slag smertestillende midler samtidig uten etter avtale med lege. Les nøye vedlagt pakningsvedlegg.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dosering:

Barn:
15 - 25 kg (3 - 7 år):
1/2 tablett 3 ganger i døgnet.
25 - 40 kg (7 - 12 år):
1 tablett 3 ganger i døgnet.

Voksne og barn:
Over 40 kg (12 år):
1 - 2 tabletter 3 ganger i døgnet.

Weifa AS - Oslo

Førstehjelpsutstyr: F-1

Ident	F-1
Status	Komplett med ekstra innhold
Sjekket	HGS 05-03-30


Naudsynt innhold

- Heftplaster
- Støttebind
- Steril kompress (4 stk.)
- Sårvask (våtserviett) (4 stk.)
- Enkeltmannspakke
- Gassbind (2stk)
- Saks
- Sportstape
- Plaster (fleire)

Ekstra innhold

- Munn-til-munn-maske
- Hansker
- Pinsett
- Paracet (4 tablettar)
- Solkrem
- Lidokainsalve (xylokain, brannsalve)

Kladd 19. mai. Vurder behov framover..



Ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstrasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber. Ubekvemt ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere slag smertestillende midler samtidig uten etter avtale med lege. Les nøye vedlagt pakningsvedlegg.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dosering:

Barn:
15 - 25 kg (3 - 7 år):
1/2 tablett 3 ganger i døgnet.
25 - 40 kg (7 - 12 år):
1 tablett 3 ganger i døgnet.

Voksne og barn:
Over 40 kg (12 år):
1 - 2 tabletter 3 ganger i døgnet.

Weifa AS - Oslo

Førstehjelpsutstyr: F-2

Ident	F-2
Status	Saknar solkrem, elles komplett med ekstra innhald.
Sjekket	HGS 05-03-30


Naudsynt innhald

- Heftplaster
- Støttebind
- Steril kompress (4 stk.)
- Sårvask (våtserviett) (4 stk.)
- Enkeltmannspakke
- Gassbind (2stk)
- Saks
- Sportstape
- Plaster (fleire)

Ekstra innhald

- Munn-til-munn-maske
- Hansker
- Pinsett
- Paracet (4 tablettar)
- Solkrem
- Lidokainsalve (xylokain, brannsalve)

Kladd 19. mai. Vurder behov framover..



Ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstrasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber. Ubekveme ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere slag smertestillende midler samtidig uten etter avtale med lege. Les nøye vedlagt pakningsvedlegg.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dosering:

Barn:
15 - 25 kg (3 - 7 år):
1/2 tablett 3 ganger i døgnet.
25 - 40 kg (7 - 12 år):
1 tablett 3 ganger i døgnet.

Voksne og barn:
Over 40 kg (12 år):
1 - 2 tabletter 3 ganger i døgnet.

Weifa AS - Oslo

Førstehjelpsutstyr: F-3

Ident	F-3
Status	Ny veske. Manglar sportstape og 1 steril kompress.
Sjekket	Fyllt 05-05-02 HGS


Naudsynt innhald

- Heftplaster
- Støttebind
- Steril kompress (4 stk.)
- Sårvaske (våtserviett) (4 stk.)
- Enkeltmannspakke
- Gassbind (2stk)
- Saks
- Sportstape
- Plaster (fleire)

Ekstra innhald

- Munn-til-munn-maske
- Hansker
- Pinsett
- Paracet (4 tablettar)
- Solkrem
- Lidokainsalve (xylokain, brannsalve)

Kladd 19. mai. Vurder behov framover..



Ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstrasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber. Ubekveme ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere slag smertestillende midler samtidig uten etter avtale med lege. Les nøye vedlagt pakningsvedlegg.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dosering:

Barn:
15 - 25 kg (3 - 7 år):
1/2 tablett 3 ganger i døgnet.
25 - 40 kg (7 - 12 år):
1 tablett 3 ganger i døgnet.

Voksne og barn:
Over 40 kg (12 år):
1 - 2 tabletter 3 ganger i døgnet.

Weifa AS - Oslo

Førstehjelpsutstyr: F-4

Ident	F-4
Status	Ny veske. Tom.
Sjekket	??


Naudsynt innhold

- Heftplaster
- Støttebind
- Steril kompress (4 stk.)
- Sårvask (våtserviett) (4 stk.)
- Enkeltmannspakke
- Gassbind (2stk)
- Saks
- Sportstape
- Plaster (fleire)

Ekstra innhold

- Munn-til-munn-maske
- Hansker
- Pinsett
- Paracet (4 tablettar)
- Solkrem
- Lidokainsalve (xylokain, brannsalve)

Kladd 19. mai. Vurder behov framover..



Ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstrasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber. Ubekvemt ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere slag smertestillende midler samtidig uten etter avtale med lege. Les nøye vedlagt pakningsvedlegg.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dosering:

Barn:
15 - 25 kg (3 - 7 år):
1/2 tablett 3 ganger i døgnet.
25 - 40 kg (7 - 12 år):
1 tablett 3 ganger i døgnet.

Voksne og barn:
Over 40 kg (12 år):
1 - 2 tabletter 3 ganger i døgnet.

Weifa AS - Oslo